



Skal vi hjælpe?

Vi hjælper gerne vore kunder til at et godt resultat med Pictorial Meadows og du er velkommen til at kontakte os for dit eget projekt

Mail jan@florum.dk
Telefon 23 98 66 45



www.pictorialmeadows.co.uk



Såvejledning

Florum.dk



Såtid og planlægning

Hvornår: Så om foråret, når jorden er ved at blive varm – i Danmark typisk fra medio april til slutningen af maj.

Hvor: Du kan så på en åben og solrig plads. Pictorial Meadows annuelle frø kan vokse fint på forskellige jordtyper – de behøves ikke at vokse i en næringsfattig eller udpint jord.

Tips til din planlægning af blomstereng fra Pictorial Meadows:

1. Tænk stort for at få "WOW-effekt"! – Det giver et bedre visuelt resultat at lave et stort bed i forhold til flere små bede.
2. Når man anlægger bede langs veje, anbefaler Pictorial Meadows en bed-bredde på 4 meter, for at få optimal effekt. Hvis du har en kant af klippet græs omkring din blomstereng, fremhæves blomsterne af den grønne ramme. Tag højde for bredden af de plæneklippere, du normalt anvender på disse områder, når bedets dimensioner planlægges.

Forberedelse af jord

1. I løbet af efteråret eller i det tidlige forår kan du med fordel fjerne græs og ukrudt, hvor blomsterengen skal anlægges.
2. Før såningen fræses jorden i cirka 20 cm's dybde på ny steder eller i cirka 10 cm's dybde, hvor der allerede har været blomstereng.
3. Jorden kan om nødvendigt gødes let, da dette vil give en lidt kraftigere vækst. Det vil især være aktuelt på meget næringsfattige jorde, eller hvis du har haft Pictorial Meadows blomstereng på arealet i flere år.
4. Hvis jorden er knoldet, bør den rives igennem. Bedet er nu klar til såning.



Såning af frø

Såtæthed: Ved såning af annuelle frø skal der beregnes 3 gram frø pr. kvadratmeter.

Ved højere såtæthed kommer ikke alle arter i blandingen i god vækst på grund af konkurrence fra andre arter i den tætte bestand. Senere på sæsonen har en for tæt sået blanding tendens til at lægge sig.

Ved planlægning af såningen kan du med fordel tilrettelægge arbejdet, så det udføres umiddelbart før en regnfuld periode.




Opmåling af bed: Før du kan beregne den nødvendige frømængde, skal du måle længden og bredden af det nye. Man kan nemt beregne den nødvendige mængde frø på denne måde:

Først beregnes bedets areal ved at gange bed-længden med bredden – begge målt i meter.

Antal gram frø er så bedets samlede areal ganget med 3, der jo er den anbefalede mængde frø pr. kvadratmeter.

$$3 \text{ m} \times 2 \text{ m} = 6 \text{ m}^2$$
$$6 \text{ m}^2 \times 3 \text{ gram} = 18 \text{ gram}$$



Du kan så frøene på to måder

– generelt vil jeg anbefale metode 2 for bedste resultat.



Metode 1 - HURTIG SÅNING

1. Mix frøene med TØRT sand (5 dele sand til 1 del frø) og fordel dem udover arealet. Sandet hjælper med til at vise, hvor langt du har sået.
2. Efterfølgende river du forsigtigt jorden så frøene jorddækkes. Jorden trykkes til med en skovl. Endnu bedre er det at tromle jorden med en gittertromle.

Metode 2 – NØJAGTIG SÅNING

1. **Opmåling af bed:** Inddel dit bed i mindre felter med pinde og snor. Beregn arealet for hvert felt. Formålet med at inddele bedet i mindre såfelter er, at sikre, at du ikke kommer til at mangle frø til den sidste del af bedet.
2. **Såning:** Vej frøene af til hvert af felterne. Del denne portion frø i to dele og bland hver frøportion op med tørt sand (5 dele sand til 1 del frø). Den ene halvdel bruger du til at så på "langs" i feltet, og den anden halvdel bruger du til at så på tværs i feltet. Gentag proceduren i alle de andre felter.
3. **Tromling:** Efter såningen skal det tilsåede areal tromles med gittertromle. Det er vigtigt, at frøene har jordkontakt, da det sikrer god fremspiring. Dette punkt må man ikke springe over.
4. **Vanding:** Hvis foråret er tørt, bør du give arealet en start-vanding umiddelbart efter såningen. Vand forsigtigt, så frøene ikke skylles væk.

Vækst & vedligeholdelse

Vækst: Spiringen sker normalt ret hurtigt og typisk indenfor 7 til 10 dage, så længe der er tilstrækkelig fugtighed og varme i jorden.

Lugning: Der kan komme ukrudt i løbet af blomstringssæsonen i blomsterengen, men hvis bedet er blevet rensat godt op inden såningen, burde der ikke komme flerårigt ukrudt som tidsler og brændenælder. Det kan være nødvendigt med håndlugning nogle gange i løbet af sæsonen.

Efter blomstringssæsonen: Efter blomstringen kan de visne planter klippes ned med plæneklipper på højeste indstilling. Dette kan eventuelt vente til slutningen på vinteren. Vær opmærksom på, om der er etableret rod ukrudt i løbet af sæsonen, da det er vigtigt at fjerne dette ukrudt.



Efterfølgende år: I det følgende forår skal arealet kultiveres/fræses, hvis du ønsker at genså. Vi anbefaler at genså med nye frø det efterfølgende år, for at få en blomstereng i fuldt flor. De årlige blandinger er kun étårige, men kan kaste noget frø af sig. Det er dog ikke tilstrækkeligt til at give fuld blomstring det efterfølgende år.

I det efterfølgende år skal du huske at tilføre jorden gødning, ellers risikerer man en dårlig tilvækst i engen.

